

vement arrondis, ensuite presque droits et brièvement arqués près de la base, finement rebordés; angles postérieurs aigus, saillant en arrière; base sinuée devant l'écusson, largement sinuée de chaque côté; disque finement chagriné, éparcement et un peu plus finement pointillé que la tête, coupé transversalement en avant par un sillon partant des angles antérieurs, bisinué de chaque côté, effacé au milieu et marqué, près de la base, en face de l'écusson, de deux points placés à la base d'une très légère impression triangulaire; marges des angles postérieurs subconcaves, obliquement infléchies. Écusson triangulaire, faiblement convexe. Élytres un peu plus étroites à la base que la base du prothorax, arrondis aux épaules, alors aussi larges que le prothorax à la base, très brièvement arqués-élargis sur les côtés, puis atténués vers l'extrémité, d'abord presque en ligne droite, puis en arc modérément accentué, terminés chacun par une épine obtuse assez longue, séparée de l'angle sutural par un sinus, environ trois fois plus longs que larges dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries ponctuées atténuées vers l'extrémité; calus huméral bien marqués; calus préscutellaires peu accentués. Marges latérales séparées des épipleures par une carène très peu marquée à la base, plus accentuée vers le sommet. Dessous du corps convexe. Hanches postérieures séparées par un intervalle plus grand que la distance du bord interne de la hanche au bord latéral. Cavités des hanches postérieures formées nettement, ne se prolongeant pas sur le premier segment de l'abdomen.

Congo français, Ouessou (Sanga). (D^r Kerandel.) 1 individu. Collection du Muséum de Paris. — Afrique orientale allemande (Conradt). Plusieurs individus. Collections du Deutsches Entom. National-Museum de Berlin et A. Grouvelle.

Voisin de *P. antennatus* Dohrn, moins allongé et présentant un calus préscutellaire peu marqué.

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. E.-R. WAGNER
DANS LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
COLÉOPTÈRES LAMPYRIDES,

PAR M. E. OLIVIER, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

***Calyptocephalus inornatus* nov. sp.**

Oblongo-elongatus, niger; prothorace, scutello, elytrorum basi et sutura in dimidio basali rufo-testaceis; coxis anticis et intermediis rufis; antennis prothorace longioribus aterrimis; prothorace lateribus rectis, antice subogivali, basi recte truncato, angulis obtusis, longitudinaliter cari-

nato, marginibus confertim punctatis, disco autem tenuiter; elytris dehiscentibus, rugose punctatis, abdomine vix brevioribus; ultimo ventrali segmento triangulari, apice profunde inciso et juxta basim, utrinque, puncto lucido ornato. — Long. 10 millim.

Cette petite espèce vient se placer près des *C. hilaris* Ern. Oliv. et *C. austerus* Ern. Oliv., dont elle se distingue bien nettement par sa coloration. Les élytres sont noirs, avec leur base plus ou moins longuement testacée. Dans l'exemplaire de ma collection, la couleur noire ne laisse de testacé que la base et une large bordure juxtasuturale; dans celui du Muséum, seulement la moitié apicale des élytres est noire et l'autre moitié est d'un testacé rembruni.

République Argentine : province de Santiago del Estero, bords du Rio Salado, aux environs d'Icaño (Muséum de Paris ex Wagner); République Argentine : Haut Parana (ma collection).

Tenaspis zonulata nov. sp.

Elongata, ovalis, nigra, nitida; capite nigro inter antennis rufo; prothorace obtriangulari, carinato, apice obtuso, rufo, disco aurantiaco, margine basali nigro, angulis obtusis; scutello triangulari nigro, puncto rufo notato; elytris prothorace latioribus, dein ampliatis et apicem versus attenuatis, nigris, costulatis, confertissime punctatis; subtus omnino nigra, coxis et tarsorum unguiculis rufis; ultimo ventrali segmento, quadrato ♂, conico apice inciso ♀. — Long. 10 millim.

Allongé, ovulaire, tout noir à l'exception d'une tache sur la tête entre les antennes, du prothorax, d'un point sur le milieu de l'écusson, des hanches et des ongles des tarses qui sont roux. Le prothorax est orangé sur son disque; il est très étroitement bordé de noir latéralement et une bande d'un noir brillant s'étend tout le long de sa base.

République Argentine : Misiones, environs de San Ignacio (Muséum de Paris). Je possédais déjà cette espèce dans ma collection avec l'indication générale : Brésil.

Lucidota sparsicolor nov. sp.

Oblonga, nigra; ore flavo; antennis pubescentibus nigris, compressis, tenuiter dentatis; prothorace lateribus leviter arcuatis, antice rotundato, punctato, carinato, flavo, maculis duabus aurantiagis ornato, margine basali et vitta longitudinali nigris; scutello parvo, triangulari, nigro; elytris prothorace latioribus, oblongis, rugosis, costulatis, nigris; pygidio trisinuato; coxis, tarsorum unguiculis et ultimo ventrali segmento piceis; hoc recte truncato. — Long. 9 millim. — ♀ ignota.

Le prothorax, à côtés d'abord légèrement arqués, s'arrondit en avant. Il est flave avec la marge basilaire noire et une étroite bande longitudinale noire, ayant dans son milieu une carène bien saillante et partant de la base pour se prolonger jusqu'au sommet; en outre, une tache oblongue orangée est située de chaque côté de la jonction de cette bande avec la base.

Cette petite espèce, à antennes faiblement dentées, se place dans le voisinage du *L. tricolor* Ern. Oliv. et *dissimilis* Ern. Oliv., dont elle se distingue surtout par la coloration du prothorax et sa taille bien moindre.

République Argentine : Misiones, Villa Lutezia, environs de San Ignacio (Muséum de Paris). Existait déjà dans ma collection avec l'indication générale : Brésil.

NOTE SUR DIVERS COLÉOPTÈRES BUPRESTIDES
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR M. CH. KERREMANS.

Bien que la plupart des espèces mentionnées ci-dessous soient anciennement connues, je crois utile d'en donner la liste complète, parce que tous les spécimens qui m'ont été soumis portent l'indication exacte des lieux de capture, toujours intéressante à signaler. Cela permettra, dans l'avenir, de délimiter d'une façon précise l'aire de dispersion de chacune d'elles en contribuant à la fixation de leur répartition géographique.

Les espèces sont de provenances variées, les unes ayant été recueillies par la Mission du Bourg de Bozas dans l'Afrique orientale ciséquatoriale en 1903, les autres par M. G. Vasse au Mozambique en 1907, et les autres enfin au Mexique, par M. L. Diguët, en 1903 et 1904.

L'ensemble est classé par ordre systématique des genres et des espèces.

STERNOCERA CASTANEA Ol., var. DRURYI Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 7, t. XV (1904), p. 247. — Abyssinie, province équatoriale : pays de Diné (du Bourg).

S. BOUCARDI E. Saund., *Cist. Ent.*, I (1874), p. 219; Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXII (1888), pl. I, fig. 5. — Djibouti (du Bourg).

S. ORISSA Buq., *Bull. Fr.* (1837), p. 76; Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 5, pl. I, fig. 3. — Mozambique : vallée du Pungué (G. Vasse).

S. KLUGI Thoms., var. MEPHISTO Thoms., *Arch. Nat.*, t. I (1859), p. 118. — Dahomey (A. Bonhoure).

JULODIS (*Neojulodis*) SUBVITTATA E. Saund., *Tr. Ent. Soc. Lond.* (1872), p. 239. — Mozambique : vallée du Pungué (G. Vasse).